

Registar za rak

Registar za rak Koprivničko-križevačke županije, radi sustavnog bilježenja oboljelih i umrlih osoba od raka za područje Koprivničko-križevačke županije, ustrojen je 1996. godine. Broj novooboljelih i umrlih osoba od raka raste iz godine u godinu, no prikazani porast u tablici djelomično je i posljedica boljeg prijavljivanja oboljelih od raka. Na području naše županije godišnje od raka oboli u prosjeku 550 osoba, a umre prosječno 330.

Godina	NOVOOBOLJELI			UMRLI		
	Ukupno	Muškarci	Zene	Ukupno	Muškarci	Zene
2001.	481	237	247	305	185	120
2002.	471	241	230	-	-	-
2003.	440	262	180	-	-	-
2004.	553	288	265	301	180	121
2005.	515	277	238	333	188	143
2006.	606	348	258	336	202	134
2007.	203	105	98	338	209	129

Napomena: U novooboljelima se nalaze i oni s rakom kože. Podaci o novooboljelim osobama od raka u 2007. su nepotpuni jer do trenutka pisanja izvješća nije završena obrada.

Rak je već dugi niz godina na drugom mjestu uzroka smrtnosti, iza kardiovaskularnih bolesti i približno svaka peta osoba umire od raka. Broj umrlih osoba od raka je na razini 2006., ali je distribucija drugačija. Naime, porastao je broj umrlih od raka debelog i završnog dijela crijeva (kolona i rektuma) čime se broj umrlih od toga sijela raka izjednačio s rakom bronha i pluća čija je smrtnost ostala na razini prošlogodišnje.


U 2006. a prema podacima našeg Registra za rak, upisano je 606 novooboljelih osoba od raka: 348 muškaraca i 258 žena. Najviše osoba upisano je zbog raka kože, no kako je smrtnost zbog raka kože mala, najčešće se on isključuje iz statističke analize.

Sijelo	NOVOOBOLJELI 2006.		
	Ukupno	Muškarci	Žene
Koža	124	62	62
Bronh i pluća	55	46	9
Rektum	47	29	18
Kolon	38	26	12
Prostata	34	34	-
Dojka	51	-	51
Ostalo	254	151	106
Ukupno	606	348	258

Najozbiljniji problem, ne samo zbog rasta novooboljelih, već i zbog visoke smrtnosti je rak bronha i pluća te rak debelog i završnog dijela crijeva (kolona i rektuma). Rak bronha i pluća je i nadalje visok, dok je na drugom mjestu s trendom rasta u oba spola rak kolona i rektuma.

Ipak, vjerujemo da će se smrtnost od raka sniziti provođenjem Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te ozbiljnijim akcijama protiv pušenja kao najvažnijim čimbenikom rizika za rak bronha i pluća. Prema najnovijim podacima, čini se kako su akcije protiv pušenja, koje se snažniji zamah uzele prije 10-ak godina, počele pokazivati rezultat jer je rak bronha i pluća u opadanju, a kao direktna posljedica opadanja broja osoba koje puše.

Najčešća sijela raka u Županiji od 1987.-2005. po razdobljima - muškarci



Najčešća sijela raka u Županiji i kretanje od 1987.-2005. po razdobljima - žene

