

Tko je otporan na ovu bolest?

Imunitet protiv bolesti stječemo:

- **cijepljenjem** - djeca se obično cijepi s navršenih godinu dana te docjepljuju prilikom upisa u prvi razred osnovne škole,
- **prebolijevanjem** bolesti,
- **prijenosom zaštitnih protutijela s majke** koja je imuna **na dijete** - pasivni imunitet. Protutijela obično štite dijete tijekom većeg dijela prve godine života.



Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje da je od 2000. do 2013. god. cijepljenje protiv ospica spriječilo oko 15,6 milijuna potencijalnih smrtnih slučajeva u svijetu.




Kada se trebate javiti liječniku?


Osobama koje primijete gore navedene simptome, a nisu preboljele ospice, niti su protiv njih cijepljene preporučujemo da se što prije jave svom liječniku da bi se bolest pravovremeno dijagnosticirala i evidentirala.

Ukoliko je s liječnikom dogovoreno kućno liječenje, svakako se trebate ponovno javiti ukoliko se pojave: bol u uhu, produktivni kašalj, grčevi (konvulzije) ili ako se simptomi bolesti ne počnu povlačiti nakon tjedan dana.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**



OSPICE
(MORBILI, MALE BOGINJE)



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10
48000 Koprivnica

Pripremile: Danijela Pinter, dr.med, spec. epidemiolog
Služba za epidemiologiju
Kontakt: 048 / 655 – 120
www.zzjz-kkz.hr

www.zzjz-kkz.hr

OSPICE

Ospice su izrazito zarazna virusna bolest.

Izvor zaraze je **bolesnik 4 dana prije i 4 dana nakon** izbijanja ospica.

Virus ospica bolesna osoba u okolinu širi kašljanjem i kihanjem. U bliskom kontaktu s takvom osobom do zaražavanja dolazi nakon izravnog kontakta sa sekretom iz nosa ili ždrijela.

Od trenutka zaraze do pojave simptoma bolesti obično protekne oko 7 do 14 dana. Na početku bolesti obično se javlja povišena tjelesna temperatura (do 40°C), simptomi od strane dišnog sustava, suhi kašalj, globolja i iscjedak iz nosa, te crvenilo i suženje očiju. Nekoliko dana nakon pojave prvih simptoma na sluznici usne šupljine, s unutrašnje strane obraza, javljaju se, za ospice specifične promjene, tzv. „Koplikove pjege“. Na sluznici se mogu vidjeti sitne bijele točkice koje nalikuju zrnima pijeska.



Dan do dva nakon pojave Koplikovih pjega javlja se osip po koži.

Osip počinje na čelu i iza uha te na vratu. Osip je pjegast i sitnocrven, a u roku od 24 do 48 sati proširi se po trupu i ekstremitetima.

Osip obično traje 4 do 5 dana.

Od pojave prvih simptoma do pojave ospica obično protekne 3 do 5 dana.



Kako se ospice liječe?

Ne postoji specifičan lijek protiv ospica.

Bolest se liječi simptomatski. U liječenju se koriste lijekovi za ublažavanje simptoma odnosno liječenje nastalih komplikacija bolesti.

Kakva je prognoza kod ospica?

Ukoliko ne dođe do razvoja komplikacija, ospice prolaze bez posljedica.

Manji dio oboljelih ima jednu ili više komplikacija bolesti kao što su upala uha, upala pluća, febrilne konvulzije (grčenje usljed visoke temperature), proljev ili upalu mozga (encefalitis).

Upala mozga (encefalitis) i upala pluća vodeći su uzrok smrtnosti od ospica.

**NAJBOLJA PREVENCIJA JE
CIJEPLJENJE !!!**

